

Que pasa despues de la cirugia?

- Es normal sentirse incomodo despues de la cirugia.
- Su oftalmologo/retinologo le va a prescribir las gotas necesarias y le va avisar cuando va a ser oportuno resumir sus actividades rutinarias. Usted va a recibir un parche el dia de la cirugia, ese parche se va a remover el dia de su primera cita post operatoria.
- Las Luces estellantes y las manchas flotantes pueden que persistan for un tiempo despues de la cirugia.
- Si una burbuja de gas fue colocada en su ojo, su oftalmologo/retinologo puede recomendar que el paciente mantenga la cabeza en cierta posicion para que la burbuja de gas no se mueva.
- **No vuele en un avion o viaje a lugares que tienen una altura muy alta hasta despues de que su doctor le avise que la burbuja de gas se ha disipado.**
Si la altura se aumenta demasiado puede causar que la presion de el ojo aumenta hasta niveles peligrosos.
- A veces es recomendado que los lentes se cambien unos meses mas tarde despues de la cirugia.

Cuales son los riesgos de la cirugia?

Cualquier cirugia tiene riesgos, tambien existen muchos riesgos si no se hace la cirugia, a veces hasta se puede perder la vision.

Algunos de los riesgos de la cirugia son:

- Infeccion
- Sangrado
- Presion alta en el ojo
- Catarata

La mayor parte de las cirugias para reparar un desprendimiento de retina son exitosas, pero a veces depende de la situacion particular de cada paciente se necesitan mas de una cirugia.

Algunos casos de desprendimiento de retina no se pueden reparar, si la retina no se puede reparar, el ojo perdera la vision hasta que no se pueda ver nada (ceguera completa).

Vas a recuperar la vision?

Si la cirugia es exitosa, la vision puede demorar muchos meses en regresar y a veces algunos pacientes no recuperan la vision.

Si el desprendimiento de retina es severa, la opcion de recuperar la vision es minima. Es **muy importante** ver a el oftalmologo inmediatamente cuando tenga el primer sintoma de desprendimiento de retina.

Complementos de
Vatsal Doshi, MD, MPH y
Boleslav Kotlyar, MD de
**Vitreous Retina Macula Specialists
of New Jersey**



VRM NJ | VITREOUS RETINA MACULA
SPECIALISTS OF
NEW JERSEY

Millburn

306 Main Street,
2nd Floor
Millburn, NJ 07041

P (973) 467-2020

F (973) 467-2030

Somerset

1543 Route 27,
Suite 12
Somerset, NJ 08873

P (732) 839-0516

F (732) 253-5259

W vrmnjretina.com
E retinamd@vrmnjretina.com




VRM NJ

VITREOUS RETINA MACULA
SPECIALISTS OF
NEW JERSEY

Desprendimiento De Retina

Una Mirada Mas Cercana



**Educacion Para
El Paciente**

Las siguientes condiciones aumentan las posibilidades de sufrir un desprendimiento de retina:

- Miopia
- Haber tenido cirugía de catarata
- Glaucoma
- Trauma en el ojo
- Desprendimiento de retina en ese ojo o en el otro
- Historia familiar de ruptura de la retina
- Áreas débiles en la retina (descubiertas por el oftalmólogo)

Cuales son los síntomas de un desprendimiento de la retina?

Estos son los síntomas que pueden indicar la presencia de un desprendimiento de retina:

- Luces estallantes
- Manchas flotantes
- Oscuridad en la periferia de la visión
- Una cortina que se mueve de lado a lado en la visión

La presencia de uno de estos síntomas no significa que exista un desprendimiento de retina, pero si que necesita ver a un oftalmólogo de inmediato.



Tu oftalmólogo puede diagnosticar un desprendimiento de retina a través de una examinación oftalmológica, en la cual a través de ponerte gotas en el ojo afectado para dilatar la pupila, el oftalmólogo va a poder observar la parte posterior de el ojo. Sin una examinación de fondo no se puede determinar si existe un desprendimiento de retina.

Que tratamiento se necesita para reparar un desprendimiento de retina?

Desgarro de la retina

Los desgarros de la retina a diferencia de un desprendimiento de retina se pueden tratar con laser o con crioterapia, estas terapias sellan la retina a la pared posterior de el ojo. Estos tratamientos causan pocas molestias y pueden ser administrados en la oficina de su oftalmólogo/retinólogo. Estos tratamientos estan diseñados a prevenir un desprendimiento de retina.

Rupturas de la retina

Casi todos los pacientes con desprendimiento de retina requieren cirugía para devolver la retina a su posición original.


Tipos de cirugía para reparar la retina

Existen muchas maneras de reparar la retina, la decisión de cual tipo de cirugía se necesita o que tipo de anestesia se va a usar depende de que tipo de ruptura existe. En los siguientes métodos, su oftalmólogo/retinólogo localizará los desgarros de la retina y va a usar tratamiento de laser o crioterapia para sellar la retina.

Hebilla escleral

Este tratamiento envuelve colocar una hebilla escleral alrededor de el ojo para contrarrestar la presión que esta moviendo a la retina fuera de su lugar.

El oftalmólogo/retinólogo muy a menudo tiene que remover el fluido que esta debajo de la retina, permitiéndole a la retina que vuelva a la posición original en la pared posterior de el ojo. Este procedimiento se realiza solamente en un cuarto quirúrgico no en una oficina.



Retinopexia Neumatica

En este tipo de tratamiento se inserta una burbuja de gas en el espacio donde se localiza el vítreo en el ojo, en combinación con el tratamiento de laser y de crioterapia. La burbuja de gas empuja la retina contra la pared posterior de el ojo.

Con este tratamiento el paciente va a tener que posicionar su cabeza mirando a abajo por algunos días. La burbuja de gas eventualmente se evaporará, algunas veces este procedimiento se puede hacer en la oficina de el oftalmólogo/retinólogo.

Vitrectomia

Esta cirugía se realiza en un cuarto de cirugía no en la oficina de el Doctor. La gelatina de el vítreo que esta empujando la retina haciéndola que se rompa, es removida de el ojo y reemplazada con una burbuja de gas.

El cuerpo humano va a generar fluidos corporales que eventualmente van a reemplazar la burbuja de gas, algunas veces una vitrectomia en combinación con una hebilla escleral es recomendada.

